

DECRISE[®]

GABAPENTINA

USO VETERINÁRIO

ANSIOLÍTICO DE USO ORAL PARA GATOS

Fórmula

Cada comprimido de **DECRISE[®] 50 mg** contém:
Gabapentina 50 mg
Excipientes q.s.p. 100 mg

Cada comprimido de **DECRISE[®] 100 mg** contém:
Gabapentina 100 mg
Excipientes q.s.p. 200 mg

Cada comprimido de **DECRISE[®] 200 mg** contém:
Gabapentina 200 mg
Excipientes q.s.p. 400 mg

Informações técnicas

DECRISE[®] é um produto que contém gabapentina. A Gabapentina é conhecida por ter efeitos ansiolíticos, sedativos, anticonvulsivantes e analgésicos. Liga-se especificamente a subunidade alfa-2-delta-1 ($\alpha 2\delta_1$) dos canais de cálcio voltagem-dependentes pré-sinápticos que estão presentes no cérebro dos mamíferos, realizando uma subsequente modulação desses canais. Por meio dessa ligação, inibe o fluxo de cálcio nas células nervosas, gerando a liberação reduzida de vários neurotransmissores monoaminas, incluindo noradrenalina, e diminuindo a transmissão sináptica de neurotransmissores excitatórios específicos como o glutamato, resultando na redução do circuito de neurotransmissão do medo, que é patologicamente ativado pela ansiedade. Autores sugerem também que a gabapentina possui um efeito sobre a redução da liberação fisiológica das catecolaminas durante a resposta de luta e fuga.

A absorção da gabapentina não é influenciada pela alimentação. Gatos podem ter uma alta variabilidade individual na taxa de absorção oral que pode ocorrer em aproximadamente 100 minutos após a ingestão, e a biodisponibilidade é de 89%. Os parâmetros farmacocinéticos da gabapentina após a administração oral em doses únicas e repetidas de 20 mg/kg em gatos saudáveis, apresentaram tempo de concentração plasmática máxima (T_{max}) médio de 1,5 hora, concentração plasmática máxima (C_{max}) média de 242 ng/ml/mg e área sob curva (AUC) média de 1587 ng/ml/mg. A excreção da gabapentina ocorre principalmente por via renal, portanto recomenda-se que gatos com doença renal tenham a dose ajustada. Estudos demonstram que a gabapentina em gatos é capaz de reduzir de forma significativa comportamentos relacionados ao estresse, agressividade, podendo aumentar a ocorrência de comportamento considerado ideal para espécie, além de também produzir efeitos que atenuam as respostas ao medo.

Indicações

DECRISE[®] é um medicamento ansiolítico indicado para gatos, para reduzir o estresse durante a contenção, manipulação para exame físico, coleta de material, posicionamento para exames diagnósticos e transporte por até 3 horas.

Posologia e modo de usar

DECRISE[®] deve ser administrado exclusivamente por via oral. A dose recomendada é de 50 a 100 mg/gato em dose única, aproximadamente 1 hora e 30 minutos antes do evento estressor ou de acordo com as indicações do médico-veterinário.

DECRISE[®] demonstrou-se eficaz na redução do estresse durante a contenção e manipulação para exame físico, coleta de material ou posicionamento para exames diagnósticos nas doses de 50 a 100 mg/gato em dose única por via oral. A dose de 100 mg/gato demonstrou-se mais potente e duradoura devendo, portanto, ser considerada para animais mais estressados, que necessitem de uma sedação mais intensa e com duração de até 3 horas.

De acordo com o estudo de segurança em gatos, **DECRISE[®]** demonstrou-se seguro quando administrado na dose recomendada e em sobredose (200 mg/gato em dose única) durante 5 dias.

Contraindicações

DECRISE[®] por conter gabapentina, não é indicado para animais que possuam hipersensibilidade à gabapentina e a outros componentes da fórmula.

DECRISE[®] por conter gabapentina, não é indicado para animais que possuam doença hepática grave.

DECRISE[®] não é indicado para fêmeas prenhes, lactantes nem a gatos com menos de 12 meses de idade, pois ainda não foram realizados estudos com esses grupos.

DECRISE[®] não é indicado para animais cardiopatas graves e/ou pacientes hemodinamicamente instáveis, pois ainda não foram realizados estudos com esses grupos.

DECRISE[®] não é indicado para gatos abaixo de 2,45 kg, já que o estudo de segurança não incluiu animais abaixo desse peso.

Interações medicamentosas

Interações farmacológicas com a gabapentina são raras, mas podem ocorrer com antiácidos à base de alumínio e óxido de magnésio e cimetidina.

Os antiácidos que contém alumínio ou magnésio causam a redução de 24% da absorção oral de gabapentina, dessa forma, não é indicado a administração conjunta. Caso o uso de antiácidos seja necessário, recomenda-se o intervalo de duas horas entre as administrações.

Não foram observadas interações entre a gabapentina e fenobarbital.

Efeitos adversos

Os principais efeitos adversos da gabapentina relatados em gatos, em ordem decrescente de frequência, são ataxia, letargia, bradicardia, depressão e midríase. Êmese, sialorreia, comportamento de lamber os lábios e em menor frequência fasciculação muscular e anisocoria, também foram relatados em gatos que receberam gabapentina em dose única por via oral para o transporte e exames veterinários, mas com resolução completa dos efeitos dentro de 6 horas após a administração.

O produto **DECRISE®** quando administrado na dose máxima recomendada em bula (100 mg/gato em dose única) e em sobredose (200 mg/gato em dose única), não promoveu alterações nos exames hematológicos e bioquímicos, não causou alterações cardiovasculares, respiratórias e gastrointestinais, e os animais mantiveram-se saudáveis durante todo o período analisado, mesmo quando utilizado em dose única diária durante 5 dias consecutivos. As reações manifestadas como prostração, letargia, sedação e incoordenação foram de natureza leve, transitória e sem a necessidade de intervenções e ocorreram principalmente nas avaliações de 2 horas após o tratamento, momento em que ocorreu o pico de ação do produto. Essas reações eram esperadas, uma vez que o produto **DECRISE®** produz efeito ansiolítico, reduzindo o medo, a ansiedade e o estresse, facilitando a manipulação dos gatos de maneira segura.

Precauções

Por conter gabapentina, deve-se ter cautela ao prescrever **DECRISE®** para animais que possuem doença renal crônica, caso seja necessário, o ajuste da dose é recomendado.

O uso em gatos com doença renal crônica deve ser monitorado e de acordo com a orientação do Médico-Veterinário.

Para tratamentos que precisam estender-se além do período recomendado em bula, recomenda-se a orientação e a monitoração do Médico-Veterinário, bem como a realização de exames hematológicos e bioquímicos.

Intoxicação e superdosagem

Os principais efeitos adversos esperados com doses elevadas de gabapentina em gatos são sedação, letargia e ataxia. Em caso de intoxicação recomenda-se a procura imediata do Médico-Veterinário para monitoração dos sinais vitais e tratamento de suporte. Durante a avaliação da toxicidade aguda da gabapentina em animais de laboratório, foram observados efeitos como ataxia, dificuldade para respirar, ptose palpebral, sedação, hipoatividade ou excitação. Em um estudo de toxicidade em camundongos, o único efeito observado foi diarreia, com uma incidência transitória e esporádica na metade dos animais que receberam doses de 3.000 mg/kg. Não houve mortes e lesões graves relacionados ao tratamento com gabapentina.

Advertências

Produtos de uso veterinário devem ser mantidos fora do alcance de crianças e de animais domésticos. Não devem ser armazenados junto de alimentos, bebidas ou produtos de higiene pessoal. **DECRISE®** não é indicado para fêmeas prenhes, lactantes nem a gatos com menos de 12 meses de idade, pois ainda não foram realizados estudos com esses grupos. O reajuste de doses somente deve ser efetuado de acordo com a indicação e a orientação do Médico-Veterinário.

ATENÇÃO: O USO PELO HOMEM PODE CAUSAR GRAVES RISCOS À SAÚDE.

Apresentação

Cartucho de papel contendo 2 blisters com 15 comprimidos bissulcados (apresentação **DECRISE® 50 mg**).

Cartucho de papel contendo 2 blisters com 15 comprimidos bissulcados (apresentação **DECRISE® 100 mg**).

Cartucho de papel contendo 2 blisters com 15 comprimidos bissulcados (apresentação **DECRISE® 200 mg**).

Cuidados de conservação

Manter em local seco, a temperatura ambiente (15°C a 30°C), ao abrigo da luz solar direta e fora do alcance de crianças e animais domésticos. Em casos de ingestão acidental procure um médico e leve a embalagem do produto.

A exposição do produto a condições extremas de calor, luz solar e umidade, desrespeitando as condições corretas de conservação indicadas, pode acarretar diminuição ou perda da atividade do princípio ativo.

Partida, fabricação e vencimento: vide embalagem.

**VENDA SOB PRESCRIÇÃO DO MÉDICO-VETERINÁRIO,
COM RETENÇÃO OBRIGATÓRIA DA NOTIFICAÇÃO DE RECEITA.**

Produto licenciado no Ministério da Agricultura e Pecuária, sob o nº SP 001692-6.000010 em 09/06/2025.

Proprietário e Fabricante

Biolab Sanus Farmacêutica Ltda.
Av. Francisco Samuel Lucchesi Filho, 1039
Bragança Paulista – SP
CEP: 12929-600
CNPJ: 49.475.833/0018-46
SAC: 0800 941 5566

Responsável Técnica:

Daniela Ziolkowski
CRF-SP 29486

Vencimento: 24 meses após a data de fabricação. Após o fracionamento do comprimido, as partes devem ser utilizadas em até 72 horas.

Avert

MEB9BL44 - PHC 4773 - 320 x 180 mm