

# MELLIS<sup>®</sup> VET

MELOXICAM

## USO VETERINÁRIO

Anti-inflamatório não esteroidal de uso oral para gatos.

### Fórmula

Cada comprimido de Mellis<sup>®</sup> Vet 0,2 mg contém:

Meloxicam ..... 0,2 mg  
Excipientes q.s.p. .... 70 mg

### Informações técnicas

O meloxicam é um anti-inflamatório não esteroidal (AINE), inibidor preferencial da enzima ciclooxigenase do tipo 2 (COX<sub>2</sub>), pertencente à classe dos oxicans, que inibe a produção de prostaglandinas envolvidas no processo inflamatório. O fármaco apresenta ação analgésica, antipirética e anti-inflamatória. O meloxicam é rapidamente absorvido por via oral, atinge pico plasmático adequado em até 7 horas e pode ser administrado junto com o alimento, 1 vez ao dia. O fármaco é eliminado de forma inativa nas fezes, na urina e na bile.

### Indicações

Mellis<sup>®</sup> Vet 0,2 mg é indicado como analgésico e anti-inflamatório para gatos.

**A EFICÁCIA DESTE PRODUTO NÃO FOI AVALIADA PELO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO (MAPA).**

### Posologia e modo de usar

Mellis<sup>®</sup> Vet 0,2 mg deve ser administrado exclusivamente pela via oral. A dose recomendada é de 0,1 mg/kg na primeira dose, seguido de 0,05 mg/kg a cada 24 horas por até 14 dias de acordo com a tabela abaixo.

Peso do animal em kg	Primeiro dia 0,1 mg/kg 1 vez ao dia	Segundo e demais dias 0,05 mg/kg 1 vez ao dia
2 kg	1 comprimido de 0,2 mg	½ comprimido de 0,2 mg
4 kg	2 comprimidos de 0,2 mg	1 comprimido de 0,2 mg

De acordo com o estudo de eficácia realizado com gatos, o produto Mellis<sup>®</sup> Vet 0,2 mg foi considerado 100% eficaz para o controle da dor aguda e da inflamação, quando administrado na dose inicial de 0,1 mg/kg no primeiro dia, seguida pela dose de 0,05 mg/kg nos dias subsequentes, a cada 24 horas por 7 dias, em gatas submetidas a ovariossalpingo-histerectomia (OSH). O tratamento poderá ser prolongado até o 14<sup>º</sup> dia, de acordo com os resultados obtidos pelo estudo de segurança realizado com o produto.

### Contraindicações

O produto não deve ser administrado a gatos com hipersensibilidade ao meloxicam ou a qualquer componente da fórmula. Não é recomendado para fêmeas prenhes, lactantes, nem a gatos com menos de 12 meses de idade, pois ainda não foram realizados estudos com esses grupos. Mellis<sup>®</sup> Vet 0,2 mg, assim como todos os anti-inflamatórios não esteroidais, não é recomendado para gatos portadores de distúrbios hemorrágicos, doenças cardiovasculares, hepáticas, renais e gastrointestinais, nem a animais desidratados, hipovolêmicos e hipotensos.

### Interações medicamentosas

Recomenda-se evitar o uso concomitante de Mellis® Vet 0,2 mg com anticoagulantes, outros anti-inflamatórios – esteroidais ou não esteroidais –, diuréticos, inibidores da enzima convertora de angiotensina (IECAs) e fármacos potencialmente nefrotóxicos, devido ao risco de aumento da incidência de efeitos adversos.

### Efeitos adversos

Diante do estudo de segurança realizado com gatos, o produto Mellis® Vet 0,2 mg demonstrou-se seguro, quando ministrado nas doses recomendadas e no dobro da dose, por até 14 dias consecutivos. Pode ocorrer hiporexia em animais mais suscetíveis, com progressão para anorexia e desidratação. O quadro regride com a interrupção do uso do medicamento e/ou com o tratamento de suporte adequado. Durante esse período, não foram observadas alterações em exames hematológicos e bioquímicos.

### Precauções

A segurança de Mellis® Vet 0,2 mg não foi testada em gatas gestantes ou lactantes, em gatos usados para procriação, nem em gatos com idade abaixo de 1 ano.

### Intoxicação e superdosagem

Em casos de intoxicação ou superdosagem, procurar um médico-veterinário para avaliação do animal e prescrição de tratamento de suporte. Reações como hiporexia, anorexia e desidratação ocorreram em gatos que receberam o dobro da dose recomendada, cujo quadro regrediu com a interrupção da utilização do produto e/ou tratamento suporte adequado.

### Advertências

Produtos de uso veterinário devem ser mantidos fora do alcance de crianças e de animais domésticos. Não devem ser armazenados junto de alimentos, bebidas ou produtos de higiene pessoal. Não foram realizados estudos de segurança com gatos abaixo de 1 ano de idade, fêmeas prenhes e lactantes.

### Apresentação

Blister com 10 comprimidos bissulcados.

Blister com 4 comprimidos bissulcados (AMOSTRA GRÁTIS)

### Cuidados de conservação

Manter o produto em local seco, sob temperatura ambiente (de 15°C a 30°C), ao abrigo da luz solar direta e fora do alcance de crianças e animais domésticos. Em casos de ingestão acidental, procurar um médico e levar a embalagem do produto.

**Partida, data de fabricação e de vencimento:** vide embalagem.

**VENDA SOB PRESCRIÇÃO E APLICAÇÃO SOB ORIENTAÇÃO DO MÉDICO-VETERINÁRIO.**

Produto licenciado provisoriamente no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, sob o número 86/2020 em 10/08/2020.

### Proprietário e fabricante

Biolab Sanus Farmacêutica Ltda.

Av. Francisco Samuel Lucchesi Filho, 1039 Bragança Paulista - SP

CEP: 12929-600 - CNPJ: 49.475.833/0018-46 - SAC: 0800 941 5566

**Responsável técnica:** Daniela Ziolkowski, CRF-SP 29.486.

**Vencimento:** 24 meses após a data de fabricação.

MEZ56539-240 x 150mm  
PHIC 3852

**AVERT**